尿路上皮癌　レジメン一覧

レジメン名	薬剤名	投与日	1クール日数	標準クール数	備考
CBDCA+GEM	ゲムシタビン カルボプラチン	day1，8 day1	21日	4	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用day1-3
GC	ゲムシタビン シスプラチン	day1，8，15 day2	28日	3-6	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用day2-4
術前GC+ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ (Ccr≧60)	デュルバルマブ ゲムシタビン シスプラチン	day1 day1，8 day1	21日	4	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用day1-3
術前GC+ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ (40≦Ccr<60)	デュルバルマブ ゲムシタビン シスプラチン	day1 day1，8 day1，8	21日	4	ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用day1-3, 8-10
術後ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌ	デュルバルマブ	day1	28	8	
GP	ゲムシタビン パクリタキセル	day1，8，15 day1	28日		PTXの前投薬に ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ錠50mg
GEM	ゲムシタビン	day1，8，15	28日		
アベルマブ	アベルマブ	day1	14日		前投薬にﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ錠60mg +ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠600mg
エンホルツマブ　ベドチン	エンホルツマブ　ベドチン	day1，8，15	28日		
エンホルツマブ　ベドチン+ ペムブロリズマブ	エンホルツマブ　ベドチン ペムブロリズマブ	day1，8 day1	21日	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞは 35	
術後ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ2週毎	ニボルマブ	day1	14日	最長12ヶ月	
術後ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ4週毎	ニボルマブ	day1	28日	最長12ヶ月	
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	day1	21日	35	